

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM – vježba 3

Naziv vježbe:

Modeliranje prvog gornjeg kutnjaka (16 ili 26)
Rezbarenje drugog gornjeg sjekutića (12 ili 22)

Sadržaj vježbe:

TEORETSKI DIO

- morfološke osobitosti prvog gornjeg kutnjaka
- morfološke osobitosti drugog gornjeg sjekutića

PRAKTIČNI DIO

- modeliranje u plastelinu prvog gornjeg kutnjaka
- rezbaranje u sadri drugog gornjeg sjekutića




KUTNJACI ČOVJEKA

- imaju glavnu ulogu u žvakanju hrane
- održavaju okomite dimenzije lica
- opće morfološke osobine gornjih kutnjaka:
 - imaju najveću griznu plohu od svih gornjih zuba
 - krune su šire u bukooralnom nego u meziodistalnom smjeru
 - imaju tri do pet krvica (najčešće tri velike krvice i četvrta manja)
 - imaju najmanje dvije bukalne krvice
 - distobukalne i meziopalatinalne krvice su obično povezane kosim grebenom
 - meziobukalna, distobukalna i meziopalatinalna krvica tvore trokut
 - meziobukalna krvica je veća od distobukalne
 - distobukalna krvica je najmanja
 - najčešće imaju tri korijena




GORNI TRAJNI KUTNJACI okluzalno



gornji desni
treći kutnjak gornji desni
drugi kutnjak gornji desni
prvi kutnjak



TRAJNI KUTNJACI




GORNI KUTNJACI

Gornji kutnjaci	Duljina krune (mm)	Mezo-distalni promjer (mm)	Vestibulo-oralni promjer (mm)	Duljina zuba (mm)	Nicanje zuba (god)
Prvi	7,5	10,0	11,0	19,5	6
Drugi	7,0	9,0	11,0	18,0	12
Treći	6,5	8,5	10,0	17,5	18+



PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - bukalno


- prvi gornji trajni kutnjak ima ulogu sidra gornjeg Zubnog luka zbog vremena nicanja i položaja u Zubnom luku
- mezikralna i distalna krvica su odijeljene bukalnom brazdom
- mezikralni obris je izbočen u okluzalnoj i srednjoj trećini krune
- distalni obris je izbočen od vratne crte prema rubnom grebenu
- vratna crta ima oštar vrh u sredini bukalne plohe
- tri korijena: dva bukalna (meziobukalni i distobukalni) i jedan palatinarni



MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM – vježba 3

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - palatalno

- dvije nejednake krvžice: meziopalatinalna i distopalatinalna
- meziopalatinalna krvžica čini 4/5 širine krune
- distopalatinalna krvžica je kraća i uža
- između krvžica se nalazi palatinalna brazda
- na meziopalatinalnoj krvžici može biti izraženo Carabellijevo svojstvo (varira od izgleda brazde do samostalne krvžice)




STOMATOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ZAVOD ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU
UNIVERSITY OF ZAGREB
DEPARTMAN ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM – vježba 3

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - mezijalno

- bukopalatinalni promjer je najveći u cevikalnom području
- vide se meziobukalna i meziopalatinalna krvžica (te Carabellijeva krvžica ako postoji)
- bukalni obris je najizbočeniji u vratnometu području
- palatinalni obris je izbočen od vratne crte prema vršku meziopalatinalne krvžice
- vratna crta je nepravilna, lagano izbočena prema okluzalno
- vide se meziobukalni i palatinalni korijen




STOMATOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ZAVOD ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU
UNIVERSITY OF ZAGREB
DEPARTMAN ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM – vježba 3

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - distalno

- distobukalna krvžica, distalni rubni greben i distopalatinalna krvžica tvore okluzalni obris krune
- vide se i meziobukalna i meziopalatinalna krvžica
- bukalni i palatinalni obrisi su istovjetnog oblika
- vratna crta je gotovo ravna
- vide se sva tri korijena
- palatinalni korijen je najduži




STOMATOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ZAVOD ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU
UNIVERSITY OF ZAGREB
DEPARTMAN ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM – vježba 3

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - okluzalno

- obris je četverokutan ili romboidan
- normalno izražen znak luka na bukalnoj stijenci
- središnja jamica i razvojne brazde naliče na slovo H
- mezijalni (dulji) i distalni (kraći) rubni grebeni su izdignuti




STOMATOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ZAVOD ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU
UNIVERSITY OF ZAGREB
DEPARTMAN ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM – vježba 3

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK - okluzalno

- trigonum ili mezijalna polovica zuba ima 3 krvžice:
 - meziobukalnu
 - distobukalnu
 - meziopalatinalnu
- talon čine distopalatinalna krvžica i distalni rubni greben
- trigonum je evolucijski stariji dio zuba, a talon mlađi
- središnja udubina trigonuma jednak je udaljena od sve tri krvžice




STOMATOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ZAVOD ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU
UNIVERSITY OF ZAGREB
DEPARTMAN ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM – vježba 3

PRVI GORNJI TRAJNI KUTNJAK endodontski prostor

- četiri pulpna roga – po jedan ispod svake krvžice s tim da su mezijalni viši od distalnih, a distopalatinalni je najmanji
- tri zasebne korijenske kanale koja su svojom veličinom proporcionalna veličini korijenova
- u mezijalnom korijenu se nerijetko mogu naći dva korijenska kanala: meziobukalni i meziopalatinalni
- poprečni presjek: tri ulaza u kanale tzv. Blackov trokut



STOMATOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ZAVOD ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU
UNIVERSITY OF ZAGREB
DEPARTMAN ZA DENTALNU ANTROPOLOGIJU

MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM – vježba 3

GORNJI BOČNI SJEKUTIĆ

Gornji sjekutići	Duljina krune (mm)	Mezo-distalni promjer (mm)	Vestibulo-oralni promjer (mm)	Duljina zuba (mm)	Nicanje zuba (god)
Središnji sjekutić	10,50	8,50	7,00	23,50	7
Bočni sjekutić	9,00	6,50	6,00	22,00	8



GORNJI BOČNI SJEKUTIĆ - labijalno

- palatinala ploha krune gornjeg bočnog sjekutića je vrlo slična onoj u središnjem sjekutiću
- marginalni rubovi i cingulum su vrlo često izrazitiji, a palatinala udubina dublja nego na središnjem sjekutiću


cingulum

palatinala udubina

bočni gornji desni sjekutić središnji gornji desni sjekutić

GORNJI BOČNI SJEKUTIĆ - labijalno

- kruna bočnog sjekutića je izrazito zaobljena i meziodistalno je uža i kraća nego kruna središnjeg sjekutića
- meziopinčalni kut je blago zaobljen, a distoinčalni je kut znatno zaobljeniji nego u središnjem sjekutiću
- dodirne plohe na bočnim stijenkama su mezikalno bliže incizalnom brdu, dok se s distalne strane nalaze u srednjoj trećini krune
- vratna crta je konkavna
- korijen je stožast i distalno naget



bočni gornji desni sjekutić

središnji gornji desni sjekutić



GORNJI BOČNI SJEKUTIĆ - palatinalno

- palatinala ploha krune gornjeg bočnog sjekutića je vrlo slična onoj u središnjem sjekutiću
- marginalni rubovi i cingulum su vrlo često izrazitiji, a palatinala udubina dublja nego na središnjem sjekutiću

cingulum


palatinala udubina

bočni gornji desni sjekutić središnji gornji desni sjekutić



GORNJI BOČNI SJEKUTIĆ - distalno

- distalna ploha je veoma slična distalnoj plasti na gornjem središnjem sjekutiću
- vratna crta je plića s distalne strane u odnosu na mezikalnu
- distalna dodirna točka udaljenija je od incizalnoga brda nego na mezikalnoj strani



bočni gornji desni sjekutić središnji gornji desni sjekutić




GORNJI BOČNI SJEKUTIĆ - incizalno

- kruna je incizalno značajno manja u meziodistalnom smjeru u usporedbi sa gornjim središnjim sjekutićem
- sam obris krune je zaobljeniji, te ima jajolik izgled




bočni gornji desni sjekutić



središnji gornji desni sjekutić





MORFOLOGIJA ZUBI S DENTALNOM ANTROPOLOGIJOM – vježba 3

GORNI BOČNI SJEKUTIĆ endodontski prostor

- jedan korijen i jedan korijenski kanal
- endodontski prostor je veoma sličan endodontskom prostoru srednjeg gornjeg sjekutića samo je proporcionalno manji

